

TOON DE KAART AAN ELKE ZORGVERLENER
DIE BIJ UW ZORG BETROKKEN IS EN ALS U
NAAK HET ZIEKENHUIS GAT

DRAAG DEZE KAART ALTIJD BIJ U

Informatie voor de zorgverlener

Deze patiënt wordt behandeld met pegcetacplan, waardoor de patiënt mogelijk een groter risico loopt op ernstige bacteriële infecties zoals infecties met *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* en *Haemophilus influenzae* type B.

- Ernstige bacteriële infecties kunnen snel levensbedreigend worden of fataal aflopen als ze niet worden herkend en niet vroegtijdig worden behandeld.
- De patiënt moet nauwlettend worden gemonitord op vroege tekenen en symptomen van ernstige infecties en bij vermoeden van een infectie moet de patiënt onmiddellijk worden beoordeeld. Bekende infecties moeten onmiddellijk worden behandeld.
- Bij vermoeden van een ernstige infectie moet zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de voorschrijvend arts van de patiënt. Raadpleeg de volledige samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voor meer informatie over pegcetacplan.

Patiënten die met pegcetacplan worden behandeld, moeten deze kaart altijd bij zich dragen, zodat andere zorgverleners in nood gevallen kunnen zien dat de patiënt met pegcetacplan wordt behandeld en daar door een groter risico loopt op ernstige infecties met ingekapselde bacteriën.

Informatie voor de patiënt

ASPAVELI® (pegcetacoplan) kan uw risico op ernstige infecties verhogen. Ernstige infecties kunnen snel levensbedreigend worden en tot de dood leiden als ze niet worden herkend en niet vroeg worden behandeld. Bel uw zorgverlener of ga naar de spoedeisende hulp als u een van deze tekenen of klachten van een ernstige infectie krijgt:

- hoofdpijn en koorts
- koorts en huiduitslag
- koorts met of zonder beven of koude rillingen
- buiten adem zijn
- snelle hartslag
- klamme huid
- hoofdpijn met een stijve nek of stijve rug
- hoofdpijn met misselijkheid of overgeven
- ogen die gevoelig zijn voor licht
- spierpijn met grieppachtige klachten
- in de war zijn
- heel erg pijn of heel veel ongemak

Draag deze kaart altijd bij u tijdens de behandeling en tot 8 weken na uw laatste dosis. Uw risico op ernstige infecties kan blijven bestaan tot enkele weken na uw laatste dosis.

Wilt u meer informatie over uw medicijn?
Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.



**Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener
die bij uw zorg betrokken is**

Naam van de patiënt

Nummer voor gecontroleerde distributie (CD-nummer), wanneer van toepassing

Ziekenhuis en naam van de voorschrijver

Telefoonnummer van de voorschrijver